



**Centrum Medyczne
im. Bitwy Warszawskiej 1920 r.
w Radzyminie -**

Formularz 225

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów
Opieki Zdrowotnej

ŚWIADOMA ZGODA NA WYKONANIE BADANIA SPIROMETRYCZNEGO
Badania nie należy przeprowadzać jeśli występuje którekolwiek z poniższych przeciwwskazań.

Przeciwwskazania:

1. tętniaki aorty brzusznej lub piersiowej (≥ 60 mm) lub tętnic mózgowych;
2. świeża operacja okulistyczna (np.: zaćmy, jaskry czy po odwarstwieniu siatkówki powyżej 6 miesięcy);
3. dolegliwości bólowe po operacji w zakresie jamy brzusznej lub klatki piersiowej, utrudniające pełny wdech i wydech w czasie badania;
4. odma opłucnowa (do 4 tygodni od wyleczenia);
5. zawał mięśnia sercowego przebyty w ostatnim miesiącu;
6. krwioplucie o nieznanym przyczynie, niewydolność oddechowa;
7. wstrząs i posocznica;

TAK	NIE
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Przeciwwskazaniem mogą być też: dolegliwości bólowe w okolicy twarozczaszki, zawroty głowy, wysiłkowe nietrzymanie moczu, ograniczenia w sferze psychicznej.

Czy Pan/Pani stosuje przewlekle leki wziewne? TAK NIE

Jeśli tak, to jakie _____

Ja niżej podpisany/a _____

PESEL _____

Oświadczam, że po zapoznaniu się z przeciwwskazaniami dotyczącymi badania spirometrycznego i jego przebiegiem, świadomie i dobrowolnie poddaję się temu badaniu, nie jest mi wiadomo aby dotyczyło mnie którekolwiek z przeciwwskazań.

data podpis pacjenta

Spirometria - przygotowanie do badania

Wymioty, nudności, kaszel w dniu badania mogą uniemożliwić jego przeprowadzenie.

Pacjent powinien odpowiednio przygotować się do testu:

- A. nie należy palić papierosów i e-papierosów (przez minimum 1 godzinę przed badaniem),
- B. nie należy przyjmować używek, włącznie z alkoholem (przez minimum 8 godzin),
- C. 2 godziny przed badaniem nie spożywać obfitych posiłków,
- D. 1 godzinę przed testem nie wykonywać intensywnego wysiłku.

Warto mieć na sobie ubrania pozwalające na swobodne ruchy w obrębie klatki piersiowej i brzucha.

Przebieg badania spirometrycznego

W celu przeprowadzenia testu osoba badana, proszona jest o przyjęcie wygodnej pozycji siedzącej, z wyprostowanym tułowiem.

Spirometria składa się z dwóch części. W pierwszej bada się pojemność życiową oraz jej składowe. Pacjentowi zakłada się na nos specjalny klips uniemożliwiający przepływ powietrza tą drogą. Następnie oddycha ustami za pomocą ustnika głowicy spirometru. Pacjent w trakcie testu jest instruowany o wymaganej głębokości i tempie wdechów i wydechów.

Cykl wdech-wydech powtarzany jest kilkakrotnie, jednak nie więcej niż 4 razy. Kolejnym etapem jest rejestrowanie natężonego wydechu. Po intensywnym wdechu pacjent możliwie jak najdłużej wykonuje mocny wydech.

Postępowanie w trakcie oraz po spirometrii

W przypadku wystąpienia jakichkolwiek niepokojących objawów (np. uczucia osłabienia, zawrotów głowy, bólu itd.), należy zgłosić ten fakt pielęgniarce wykonującej badanie. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów już po wykonaniu spirometrii, koniecznym jest niezwłoczne poinformowanie o tym personelu medycznego.